

LEGISLATION – ACTUALITE SOCIALE

L'invalidité dans le régime général- *La presse médicale ; 18 Octobre 2003 ; tome 32 ; n°34 ; p 1622-1626*

Description de l'invalidité générale : le contexte d'attribution ; les 3 catégories d'invalidité ; les critères d'attribution ; les recours .

Nouveau formulaire de déclaration de MP

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE

Arrêté du 5 septembre 2003 fixant le modèle du formulaire « déclaration de maladie professionnelle ou demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle »

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCS0323888A>

J.O n° 236 du 11 octobre 2003 page 17352

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Arrêté du 5 septembre 2003 fixant le modèle du formulaire « déclaration de maladie professionnelle ou demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle »

NOR: SOCS0323888A

Par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 5 septembre 2003, est fixé le modèle du formulaire S 6100 b (1) « déclaration de maladie professionnelle ou demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle ». Le modèle de déclaration demeure enregistré par la délégation aux usagers et aux simplifications administratives sous le numéro CERFA 60-3950. La notice d'utilisation est enregistrée sous le numéro 5056202.

L'arrêté du 7 juin 1994, en tant qu'il fixait le précédent formulaire, est abrogé.

(1) Ce formulaire peut être obtenu auprès des organismes d'assurance maladie. Il est également accessible, pour impression ou remplissage électronique, sur le site internet

www.ameli.fr

Loi sur les risques technologiques : dossier de l'INERIS

<http://www.ineris.fr/actualites/download/mag7.pdf>

ERGONOMIE

Etude psycho-ergonomique d'un poste de travail conjugant activité de conduite automobile et supervision d'une instrumentation technique

(C.Ribert-Van de Weerd) – *Les Cahiers de Notes Documentaires ; 3^{ème} trimestre 2003 ; n° 192 ; p. 37 à 42*

L'étude consistait à estimer la charge de travail de techniciens, fonctionnant en binômes chargés de tâches de conduite et de supervision d'instruments techniques. Elle montre notamment la nécessité de reconsidérer un projet de réorganisation des postes, combinant les deux tâches pour un seul opérateur et alourdissant la charge de travail.

Points de repère

Landmarks in occupational safety – *Les Cahiers de Notes Documentaires ; 3^{ème} trimestre 2003 ; n° 192 ; p. 43 à 48*

Quelques repères pour s'orienter dans la normalisation traitant des circuits de commande relatifs à la sécurité.

RISQUES PROFESSIONNELS

Les dommages collatéraux des nouvelles organisations du travail - (Philippe Davezies)-
Santé et Travail ; 2003 ; n° 44 ; p. 28-30

Les nouvelles formes d'organisation du travail imposées par la réduction des coûts, des stocks, des effectifs engendrent une montée des pathologies physiques et mentales chez les salariés.

Réunion-débat à Strasbourg : L'entreprise face au risque routier encouru par les salariés : quels enjeux, quelles actions de prévention ?

16 octobre 2003 - 17 h - CCI de Strasbourg

http://www.strasbourg.cci.fr/downloads/pgm_16102003.pdf

Rapport du Comité interministériel de la sécurité routière – juillet 2003-10-13

Rappel des textes, statistiques...

http://www.securiteroutiere.gouv.fr/img/pdf/dp_CISR_09-07-03.PDF

Le numéro 134 de la revue "Sécurité routière" vient de paraître, accompagné d'un numéro spécial consacré à la loi relative à la lutte contre la violence routière.

Dossier sur les statistiques des accidents, carrefour d'expériences, fiches pratiques, mais aussi nouvelles mesures de la loi en détail et reportage sur le contrôle sanction automatisé

<http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/data/revue/revue134/index134.html>

Sécurité routière

Assurer et prévenir les risques professionnels :

Dossier de la Cram pays de la Loire :

http://www.cram-pl.fr/risques/actions_prevention/formation_externerisque_routier.htm

Péricardite constrictive liée à l'exposition à l'amiante – *Revue des maladies respiratoires ; septembre 2003 ; vol 20 n°4 ; p 622-627*

2 cas sont rapportés chez des sujets antérieurement exposés à l'amiante ; ces sujets sont décédés . 8 autres cas d'épaississement ou d'épanchement péricardique attribués à l'amiante ont été retrouvés dans la littérature , souvent associés à des atteintes similaires pleurales .

Effets sur la santé de l'utilisation professionnelle du paraquat –

Arch. Mal. Prof. ; 09/ 2003 ; vol 64 ; n°5 ; p.310-324

Les effets les plus fréquents de l'exposition répétée au paraquat sont des signes d'irritation cutanée, oculaire et respiratoire. Les décès par ingestion accidentelle sont devenus rares depuis l'adjonction d'un répulsif et d'un émetisant. La pénétration du produit est possible par inhalation et sur peau lésée. L'apparition de fibrose pulmonaire ou de syndrome parkinsonien n'est pas démontrée.

L'ARC fait de la lutte contre les cancers professionnels sa priorité <http://www.jim.fr>

L'ARC s'attaque aux cancers professionnels par l'intermédiaire de son pôle de recherche en épidémiologie des cancers professionnels fondé en 2001 , en association avec le Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés . Sont ciblés les cancers liés à l'amiante , aux pesticides et aux poussières de bois .

Les facteurs de stress professionnel. Enquête auprès de salariés des services interentreprises – Arch. Mal. Prof. ; 09/ 2003 ; vol 64 ; n°5 ; p.297-309

L'enquête réalisée par 20 médecins du travail dans 14 départements a permis d'obtenir 839 réponses afin d'identifier les stressseurs professionnels et leurs relations avec l'absentéisme et le risque d'inaptitude. Selon l'étude sont reconnus comme stressseurs, la charge élevée de travail, les mauvaises relations de travail, la mauvaise définition des tâches. Par contre d'autres caractéristiques du travail le seraient moins : la personnalité du salarié, les responsabilités, le contact avec la clientèle. D'autres ne seraient pas en cause : curieusement l'absence de contrôle sur son travail, la position de subordonné. La relation stressseurs/absentéisme est par contre très significative. La relation stressseurs/inaptitude reste à prouver sur des populations plus importantes en nombre.

Le sick building syndrome (SBS) ou syndrome des bâtiments malsains - La Presse Médicale ; 11/10/2003 ; tome 32 n°33 ; p 1572-1578

Les symptômes décrits dans le SBS sont les céphalées , les troubles de la concentration , l'asthénie , l'irritation cutanée , des muqueuses nasales , oculaire ou des VAES . Il n'existe pas de théorie physiopathologique permettant d'expliquer la survenue du SBS . Des facteurs favorisants ont été suspectés : le type et le taux de ventilation , les composés organiques volatiles , les particules et l'humidité.

PREVENTION

Tests in vitro pour l'évaluation de la tolérance cutanée aux substances chimiques (D. Zissu) – Les Cahiers de Notes Documentaires ; 3^{ème} trimestre 2003 ; n° 192 ; p. 23 à 27

L'article présente deux types de protocoles, qui ont fait l'objet d'une directive européenne, après leur approbation par le CEVMA (Centre européen pour la validation des méthodes alternatives à l'expérimentation animale).

La prévention des risques professionnels dans le stockage et l'emploi des engrais solides à base de nitrate d'ammonium

Mise sur le marché ; dangers ; mesures de prévention ; entretien des installations et matériels ; bibliographie

http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/fiche_nitrate_ammonium-1.pdf

L'intolérance aux gants de latex chez le personnel soignant des Centres Hospitaliers Universitaires d'Abidjan – Arch. Mal. Prof. 09/ 2003 ; vol 64 ; n°5 ; p.329-333

Dans cette étude, un salarié sur dix présente une intolérance au latex. Cette flambée d'allergie serait liée à la recrudescence des maladies transmissibles par le sang et une augmentation de la fréquence et de la durée de port de gants protecteurs en latex. Une solution : mettre à disposition des gants de substitution sans latex en quantité suffisante

Vaccination contre le tétanos : un rappel nécessaire mais pas toujours suffisant - La Presse Médicale ; 20/09/2003 ; tome 32 n°30 ; p 1418

L'incidence du tétanos se stabilise depuis quelques années . La population à risque est constituée de femmes âgées mais aussi d'immigrés ayant échappé aux éventuels programmes vaccinaux de leurs pays d'origine . 57 cas ont été déclarés en France en 2000 et 2001 ; 2 patients sur 37 dont le statut vaccinal était connu , avaient reçu une vaccination complète au cours de leur vie .

MEDECINE

Réunion de consensus Inserm ; Vaccination contre le virus de l'Hépatite B

Texte des recommandations

La vaccination universelle des nourrissons , un programme de rattrapage de la vaccination à destination des enfants et adolescents , sont fortement recommandés.

Les professionnels de santé doivent être immunisés contre l'hépatite B ; entre autres , la vaccination des personnels des structures accueillant des handicapés mentaux , des voyageurs en pays de forte endémie , est particulièrement recommandée .

Des programmes spécifiques , dotés de ressources adéquates (incluant un dispositif permanent d'évaluation) doivent être mis en œuvre .

En cas de présence d'un porteur VHB dans une collectivité d'enfants , il convient d'étudier l'opportunité de vacciner la population contact , après vérification du statut d'immunisation VHB individuel .

Dossier sur la toxine botulinique

<http://www.sante.gouv.fr/hm/dossiers/biotox/21.htm> et

http://www.invs.sante.fr/publications/guides_biotox/guide_botulisme.html

Fatigue et comportementalisme : le sens de l'épuisement – Dr Patrick Lemoine ; *Quentin-Debray O. Neuropsych News 2003 ; 2 ; p 47-52*

L'abord T.C.C. (thérapies cognitivo-comportementales) de la fatigue consiste à redonner un sens à la fatigue en discernant les idées et les sentiments qui l'accompagnent de manière à réaliser que cette fatigue n'est que le révélateur d'un déséquilibre ; puis il s'agit de proposer au sujet de comprendre que le meilleur traitement de son symptôme est le plaisir ; enfin , une maîtrise des émotions permettra d'arriver à la dernière étape , qui consiste à augmenter ou à réduire les activités du fatigué .

L'obésité, facteur de risque de décès par cirrhose hépatique ? Dr Marc Bardou

Ioannou G. et al. "Is Obesity a risk factor for cirrhosis-related death or hospitalization? A population-based cohort study" Gastroenterology 2003; 125: 1053-59. © Copyright 2003

Les décès ou hospitalisations en rapport avec une cirrhose ont été plus fréquents chez les patients obèses et chez les patients ayant un surpoids et ne consommant pas ou peu d'alcool, que chez ceux de poids normal <http://www.jim.fr>

Estimation du nombre de cas de certains cancers attribuables à des facteurs

professionnels *Santé et travail ; 2003 ; n° 44 ; p. 60-62*

L'institut de veille sanitaire publie une étude datée de mars 2003 confirmant l'ampleur de la sous-déclaration des cancers d'origine professionnelle.

Cette étude est disponible sur Internet :

www.invs.sante.fr/publications, rubrique « Santé et travail »

Surveillance du cancer – *Bulletin épidémiologique hebdomadaire ; 21 Octobre 2003 ; n°41-42 ; p189-207*

Tous cancers confondus , le nombre de nouveaux cas a augmenté de 63% entre 1980 et 2000 , alors que le nombre de décès n'a augmenté que de 20% (l'augmentation du nombre de décès étant moindre que celle prédite par les changements démographiques) . La diminution dans le risque de décéder d'un cancer est due aux changements de nature des cancers diagnostiqués et

aux progrès thérapeutiques . Les cancers alcool-dépendants sont en diminution , les cancers du sein et de la thyroïde en augmentation .

Aucun système basé uniquement sur l'enregistrement de la morbidité , ne permet une surveillance des cancers en relation avec l'activité professionnelle...

Estimation de l'incidence nationale du mésothélioma pleural à partir du programme

national de surveillance du mésothéliome (P.N.S.M.), 1998-1999 - *Bulletin épidémiologique hebdomadaire ; 7 Octobre 2003 ; n°40 ; p185-188*

Un P.N.S.M. a été mis en place dans 18 départements . L'incidence du mésothéliome pleural est comprise entre 660 et 810 cas pour l'année 1998 et 600 et 808 cas pour l'année 1999 .

La mesure du peak-flow est-elle suffisante pour dépister les BPCO ? *Br Med J ; 2003 ; 327 ; p 653-4 ; <http://www.jim.fr>*

Chez les sujets de plus de 50 ans , la mesure du peak-flow au cabinet a une sensibilité de 91% pour dépister les BPCO et de 100% pour diagnostiquer des formes modérées à sévères . Sa spécificité est de 82% .

Les diabétiques de type 1 doivent vérifier leur glycémie avant de prendre le volant

Diabetes Care ; 2003; 26 ; p 2329-2334 ; <http://www.jim.fr>

Cette étude met en évidence une augmentation significative du risque d'incidents au volant en rapport avec la survenue d'hypoglycémies chez les diabétiques de type 1 . Pour les diabétiques de type 2, le risque d'incidents n'est pas différent de celui des témoins . Les auteurs proposent pour les diabétiques de type 1 , une vérification systématique de la glycémie avant le départ (seuil 5 mmol/l , soit 0,90 g/l)

Evolutions dans l'organisation du dépistage du cancer du col de l'utérus *Obstet Gynecol ; 2003 ; 102 ; p.417-27 ; <http://www.jim.fr>*

Début du dépistage : 3 ans après le 1° rapport , ou à partir de 21 ans

Puis 1 fois par an jusqu'à 30 ans

Après 30 ans : 2 options : soit tous les 2 à 3 ans , après 3 frottis annuels négatifs ; soit frottis et typage viral tous les 3 ans si résultats initiaux négatifs aux 2 tests ; plus fréquemment si résultats positifs à l'un des 2 .

La mort subite du jeune athlète est rarement liée au hasard et cependant difficilement prévisible – *N Engl J Med ; 11 septembre 2003 ; 349(11) ; 1064-75 ; <http://www.jim.fr>*

Dans 26,4% des cas étudiés , la cause de décès est une cardiomyopathie hypertrophique .

La 2^{ème} cause de mort subite est due à une anomalie congénitale des coronaires ;

Parmi les autres causes , il y a les myocardites , les syndromes du QT long , les drogues , les chocs thermiques avec coup de chaleur...

DIVERS MEDECINE DU TRAVAIL

Reconversion vers la médecine du travail

Décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0311418D>

Internet et la recherche documentaire en santé au travail. La pratique d'Infos Risques. – Arch. Mal. Prof. ; 09/ 2003 ; vol 64 ; n°5 ; p.325-328

Les services de santé au travail ont un grand besoin en documentations scientifiques, médicales et réglementaires fiables, validées, mises à jours et directement utilisables. La documentation trouvée à partir des moteurs de recherche n'est pas toujours crédible et directement utilisable et doit être systématiquement validée par d'autres sources d'information. Infos Risques est un service de documentation sur les risques professionnels qui a développé un outil pour manager la recherche documentaire.

Nouveaux tableaux de Maladies Professionnelles respiratoires – Revue des maladies respiratoires ; septembre 2003 ; vol 20 n°4 ; p 501-509

Le Tableau 66 présente une augmentation importante de la liste des étiologies et travaux ouvrant droit à réparation . Par ailleurs l'indemnisation des asthmes consécutifs à des exposition à des irritants devient possible .

Un Tableau 66 bis est créé pour les pneumopathies d'hypersensibilité , avec une liste d'étiologies indemnisables augmentées par rapport à l'ancien Tableau 66

Le Tableau 25 (silice) a été restructuré ; le cancer broncho-pulmonaire comme manifestation pathologique associée à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique y apparaît .

Nouveau Tableau 42 (atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels)

<http://www.legifrance.gouv.fr>

Le diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non concordance par une impédancemétrie et une recherche du réflexe stapédien ; à défaut par l'étude du suivi audiométrique professionnel . L'audiométrie diagnostique est réalisée après cessation de l'exposition au bruit d'au moins 3 jours .

Le déficit (minimum 35 dB sur la meilleure oreille) est la moyenne des déficits mesurés à 500 , 1000, 2000 et 4000 Hz

La liste des travaux devient indicative et s'enrichit de travaux dans l'industrie agro-alimentaire , dans le moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques, dans l'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits réfractaires...

SANTE PUBLIQUE

Tabagisme passif sur les lieux de travail (R. Hoffmann) – Les Cahiers de Notes Documentaires ; 3^{ème} trimestre 2003 ; n° 192 ; p. 29 à 34

Cette traduction montre, après un rappel des dangers du tabagisme passif, les évolutions législatives et réglementaires concernant ce risque en Allemagne.

Traitement des déchets des piles et accumulateurs usagés. Enquête dans des entreprises spécialisées (A.Peltier, J.M. Elcabache) – Les Cahiers de Notes Documentaires ; 3^{ème} trimestre 2003 ; n° 192 ; p. 5 à 19

Les investigations menées dans les entreprises visitées permettent de conclure à un risque important d'exposition au plomb, ainsi qu'à des dépassements fréquents des valeurs limites d'exposition pour le nickel et le cadmium. Des mesures de protection collective (piégeage des fumées à la source...) sont recommandées, en plus du port d'équipements de protection adaptés.

Rapport annuel 2003 de l'IGAS :- Santé et travail ; 2003 ; n°44 ; p.9-11

« Santé, pour une politique de prévention durable »

Dans un volumineux rapport annuel, l'inspection générale des affaires sociales dresse un bilan sévère de la politique de prévention des risques professionnels en France.

L'IGAS évoque la crise de la médecine du travail, remet en cause l'efficacité de la visite médicale systématique, la pertinence du concept d'aptitude et de celui récent de non-contre-indication. Elle préconise la création d'une agence de sécurité sanitaire au travail autonome et la mise en œuvre de plans régionaux décentralisés de santé au travail.

Lutte contre le saturnisme : en progrès , mais peut mieux faire <http://www.jim.fr>

La loi , dite de lutte contre les exclusions , adoptée le 29 Juillet 1998 , impose la réalisation d'un « état des risques d'accessibilité au plomb » (ERAP) lors d'un changement de propriétaire et lors de travaux dans les parties communes dans un immeuble d'avant 1948 ; elle impose que les enfants ayant un taux de plombémie supérieur à 100 microgr/l soient signalés.

Le ministre de la santé souhaite renforcer ces dispositions .

Réunion de consensus INSERM : Vaccination contre le virus de l'hépatite B (Mercredi 10 septembre et Jeudi 12 Septembre 2003) <http://www.inserm.fr>

Sont recommandées :

La vaccination universelle de tous les nourrissons

Le rattrapage de la vaccination des enfants et des adolescents

La sérovaccination obligatoire à la naissance des nouveaux-nés de mères Ag HBs+

Le renforcement de la vaccination des personnes exposées lors d'une situation ou d'un comportement associé à un risque élevé de contamination par le VHB

La Chine n'oublie pas la menace du SRAS <http://www.jim.fr>

Les gènes du coronavirus détecté chez des animaux propres à la consommation vendus sur les marchés chinois (civette , raton-laveur , furet) sont identiques à 99,8% à ceux du coronavirus responsable du SRAS chez l'homme . La présence d'AC du virus est également retrouvée chez des vendeurs d'animaux . Ces résultats confirment le passage du virus de l'animal à l'homme .